

ミニギャラリー

今月の題字



熊野第二小学校 6年  
益本 湧光さん

四年 田村康貴

熊野第二小学校 4年 田村 康貴 さん



熊野第二小学校 2年 田頭 駿斗 さん

町の人口と世帯数

平成30年4月30日  
(前年同月比較)



(住民基本台帳)

【評】 ひみつのたまごから生まれてきたものを想像してかきました。たまごの模様と同じ模様の恐竜が生まれ、一緒にごはんを食べていてとても楽しそうです。

【評】 「羊」という文字を横画の長さや間隔に注意をして書くことができました。また、一画目と二画目の表現がすばらしいです。筆の運びも丁寧で落ちつきがあります。

熊野の自然 (345)

オニノゲシ

(キク科)



鬼野罌粟。鬼の名は、大きいもの、刺のあるものなどに付けられます。大きくて高さ50〜120cm。葉は厚くて硬く、縁の裂片の先端は太く硬い刺になっています。キク科の植物は、一つの花に見えるのが、実は小さな花の集合体で「頭花」と呼びます。果実は、ただ一つの種子を包み、種子そのものと間違えるほど痩せていて「瘦果」と呼ばれます。ヨーロッパ原産で明治中頃渡来。今では全国に広く分布している帰化植物です。2年草で、冬は地面に根生葉を広げています。茎は直立し、中空で太く、稜があります。上の方の葉は無柄で、基部の茎を抱いた部分が多半円形です。花期は3

〜10月頃。頭花は黄色で直径2cmほど。瘦果には縦の脈だけで、横しわはありません。冠毛は白色で、ごく細く多数あります。

ノゲシの名は、葉の形や切ると白い乳液が出ることなどがケシに似るので付いています。葉は軟らかく、茎を抱く葉の基部は三角形です。瘦果には、縦の脈と多数の横しわがあります。

ノゲシ属は筒状花はなく、すべて舌状花で、葉などを切ると白い乳液が出ます。

ノゲシ属の瘦果には、瘦果の先が細長く伸びたくちばしはありません。タンポポ属の瘦果には、冠毛との間に長いちばしがあります。

【写真・文】

緑花文化士 富沢由美子

(地域振興課)



【世羅ゆり園 ゆり祭り】  
日本最大級のゆり園、「世羅ゆり園」で50品種、100万輪のゆり祭が開催されます。広大な丘で、ハウス栽培と屋外栽培の様々なゆりの花が楽しめます。花の見頃は天候により前後する場合がございますのでお問い合わせください。  
時 6月10日(日)〜7月上旬  
所 世羅町 世羅ゆり園  
¥ 大人800円 小人400円  
問 世羅ゆり園  
0847-27-15555



切り取って、電話機などに貼ってお使い下さい。

防災無線放送再生ダイヤル  
082-820-5640  
(放送終了後24時間自動消音)

